


Naturheilverfahren

Neuraltherapie

Funktionelle Herzerkrankungen



U. Aldag

FA Chirurgie Naturheilverfahren Homöopathie
Im Kieferngrund 7

14163 Berlin

www.ifn-berlin.de info@ifn-berlin.de

Tel:030/8141232 Fax:030/81499607

Neuraltherapie

**EIN
VÖLLIG
ANDERER
WEG**

**Eine andere
Betrachtungsweise**

Vegetative Nervenfasern



überall



Haare

Zähne

Nägel

Knorpel

Bulbus

nicht


Pool-Betrachtungsweise



Unfälle
Verletzungen
Operationen
Krankheiten
Seelentrauma

„SWIMMING POOL“

Connection via MATRIX



Matrix --> network of proteoglycans
and structure glycoproteins

Bei der Betrachtung der allgemeinen vegetative Anatomie

**geht es um
Verknüpfungen
Kopplung
Informationsweiterleitung**


Autonomes Nervensystem

Die vegetativen Fasern
verlaufen mit den Gefäßen


So gibt es das Schmerz-
Verbreitungsmuster



pseudoradiculärer
Schmerz




Autonomes NS Herz




Neuraltherapie im Segment


Projektionen
von
Nervenreizen
auf die
Haut



NT-Segment




Hohlorgan-NT-Segment



Segmentale Anatomie

Segmented somatic organisation:

myotom, dermatom, viscerotom



Entstehung von Störungen:

Unfälle

Verletzungen

Operationen

Herz

Krankheiten/Infektionen

Seelische Traumen

„gehen ans Herz“

Irritationen


Segmental:

Fehlbewegungen

Fehldurchblutung lokal

Infektionen mit
Ablagerungen


Störfeld



BWS-Herz-Zuordnung




Nervenäste




Facette-Muskulatur-Haut-Verbindung

Spinalis



Inj. an die Querfortsätze



Neuraltherapie

Segmentbehandlung

„DAWOS“-wehtut

Haut/Muskel/Sehnenansätze/Faszienhüllen/Triggerpunkte/Periost/Narben

Übergeordnetes Segment

Ganglien/Nerven


Störfeld




Neuraltherapeutische Segmentbehandlung

Narben im Segment mitbehandeln!

Headzonen




Herz assoziierte Schmerzen



Herz-Schmerz-Zonen

Cave! Schmerz bei Herzinfarkt




BWS

Triggerpunkte

bei Herzbeschwerden

Tp mit Herzrelevanz


zwischen
li Schulteröhe
und oberen, med.
Scapulawinkel



Tp
dorsal li.
mit Herzrelevanz

2 Tps
M.longissimus
thoracis

seltene
Schmerz-
ausbreitung



Spondylogenes Reflexsyndrom


Tonsille C6/7


Gefügelockerung

Herzrelevant

- 1 ■ M. rectus capitis ant.
- 2 □ M. intertransversarius ant cervicis
- 3 ▲ M. longissimus cervicis
- 4 ▲ M. longissimus capitis

Nackenschmerz





Zwerchfell

Schulter

Herz

**Algodystrophie-Zonen
links ventral
nach Schultertraumen**

Organzone Herz

dorsal II>

Herz




Organzone Herz

ventral



Kopf-Vagus-Verbindung



Procain-Wirkungen

- Schmerzstillend
- Fiebersenkend
- Antiallergisch
- Spasmolytisch
- Gefäßerweiternd
- Gefäßabdichtend
- Cytochrom A7A3 -
funktionssteigernd

Notfallmaßnahmen

1. sofortige Sauerstoffzufuhr

max. Sauerstoff über Nasensonde u. mit Atemreduktion u. Maske

2. Beine hoch!


3. zurückhaltend einzusetzen:

- evtl. 0,25-0,5 g Hexobarbital (bei Erwachsenen)
- 5-10 mg Valium (bei zentraler Übererregbarkeit)
- Atropin/Alupent (Bronchokonstriktor)
- Akrinor als Vasopressor (bei Atemparalyse)
- Suprarenin 1A 1/1000 in 1ml Dosen (Herztod, Kreislauf, allergischer Schock, akute Bronchospasmen u. Tachykardie mit Hypotonie u. Arrhythmie)

4. bei allergischer Reaktion:

- Calciumglukonat 10ml 10%ig i.v. (Bronchospasmen)
- Antihistaminikum 2mg i.v. (Bronchospasmen)
- Cortison 0,5-1 g i.V. (Schwäche)

Procainwirkung



U. Aldag

Kleines Herzprogrammm

Querfalte im Segment, passiv erhebbar

Triggerpunkte: Akupunkturpunkte K617, 14, BI 15


Alternativer Triggerpunktzyklus A+G 6

1. Rippe II


AC+SC-Gelenke II


Dig. Schleiddrüse
para- und retrosternale II


ventral



Höhenorientierung









Nackendruckpunkte mit Relevanz bei Herzleiden


Die
Druckpunkte
auf der
Schulterhöhe
sind relevant



Das Fass ist voll!



Krankheiten entstehen



Neuraltherapie
"Ablass" an der richtigen Stelle


Störfeld

nervaler, energetischer Herd

**Störsender
Kurzschluss**



Organzonen Herz



Beispiel

Funktionelle Herzbeschwerden


Organ: Herz, Klappen, Perikard, Koronarien

Zahnzugehörigkeit: Retromolarbereich

Nerven –Zugehörigkeit: TH2

Haut-Zuordnung:

ventral




Wahrscheinlicher Grund:

Angst, Schmerz, Verletzung, will nicht fühlen, verschließt
sein Herz

Positive Motivation:

Mein Herz vergiebt und lässt los. Es ist gut mich selbst zu
lieben. Innerer Frieden ist mein Ziel

Zahnpathologien





NT bei Lungenerkrankungen

- Q.paravertebral 2 QF seitl.d.Mittel- linie von Dorn C 7 bis Th 12
- Q.dorsal 3E15 u.LG 13 (7.HWK) = Segm.C 4
- Q.ventral über und unter SCG (M11 u.N27)
Q.im 2.u.4.ICR (N25 u.N23)
- Oberrand Mitte der Clavicula (M12)
vordere Axillarlinie (Lu 1)
- Brustbeinmitte in Höhe des 4.ICR (KG17)
bis Periost
- Ende des Proc.xyphoideus (KG15) bis Periost
- wechselseitig 1ml iv.
- Ggl.stellatum - Erkrankungsseite od.i.Wechsel
- indirekter Grenzstrang nach MINK bei Th 3 und Th 7 (Bl.13 und Bl.17)
- klopfempfindliche Dornfortsätze
- Rippenwirbelgelenke bei Druckschmerz
- Störfelder: Nasen - Rachen - Raum,NNH,
Gyn.-Raum,Nabel bei Kindern,
Ohren,Pockennarben
- parasympathische Ganglien:Ggl.sphenopalatinum,
Ggl.ciliare,N.accesorius,N.laryngeus
superior.


NT bei funktion. Herzerkrankungen

- Segment C2,C4 über Th 2 bis Th 4
- alle Narben an Kopf,Hals,Armen, Thorax bis Oberbauch
- indirekter Grenzstrang Th 4/5
- sternaler Rippenansatz Li 4+5
- TP der 6.Rippe (re.)-Arrhythmie
- Akupunkturpunkte:KG 14,17,Bl 15.
- Muskeltriggerpoints (M. pectoralis,
- M.scalenus, M.infraspinatus,M.serratus ant.)
- ACG und SCG
- N.accesorius
- Ggl.stellatum,Ggl.cervic.sup.
- Tonsille,Weisheitszähne,Ohr
- iv.






Transversalschnitt BWS



Inj. kl. Wirbelgelenke




Inj.kl.Wirbel-gelenke

4 cm lange Nadel
1 ml Procain 1%

Aspiration!

Faszetteninj. und

I



Rippen-Wirbelgelenk

Intercostal

4 cm lange Nadel

1 ml Procain 1%

